Artículos Originales

Prevalencia del consumo de cigarrillo y vaper en los estudiantes de enfermería de la Fundación Universitaria Cafam

Prevalence of cigarette and vaper consumption in nursing students at the Cafam University Foundation

JOSE ALEXANDER VALENCIA SEDANO¹ Natalia Aparicio Méndez¹ Ivonne Stefanny Rengifo Rincón¹ Mikhail Benet Rodríguez¹

Cómo citar este artículo:

VALENCIA SEDANO, J., Aparicio Méndez, N., Rengifo Rincón, I., & Benet Rodríguez, M. (2025). Prevalencia del consumo de cigarrillo y vaper en los estudiantes de enfermería de la Fundación Universitaria Cafam. *GestióN Ingenio Y Sociedad*, 5(1), 21-29. Recuperado de http://gis.unicafam.edu.co/index.php/gis/article/view/162

Resumen

Objetivo. Analizar la prevalencia del consumo de cigarrillo y vaper en los estudiantes de enfermería de la fundación universitaria Cafam. Metodología. Estudio descriptivo de 250 estudiantes de enfermería de la fundación universitaria Cafam abordando los 8 semestres, de los cuales 201 participaron. Se realizo una encuesta por medio de la plataforma Forms para dar reporte a la información de las variables, identificando el consumo en los estudiantes por cada semestre. Resultados. La prevalencia del consumo de cigarrillo y vaper en los estudiantes de enfermería de la fundación universitaria Cafam fue del 26% (65 estudiantes) y 54,3% (136 estudiantes) están expuestos a alguna de estas sustancias. Conclusión. Se encontró que la prevalencia general de consumo es alta, aunque disminuye a medida que los estudiantes avanzan en sus estudios.

Palabras clave: Hábito de fumar, factores de riesgo, enfermedades crónicas no transmisibles

Abstract

Objective. To analyze the prevalence of cigarette and vape smoking among nursing students at the Cafam University Foundation. Methodology. A descriptive study of 250 nursing students of the Cafam University Foundation, covering the 8 semesters, of which 201 participated. A survey was conducted through the Forms platform to report the information of the variables, identifying the consumption of the students for each semester. Results. The prevalence of cigarette and vaper consumption in nursing students of the Cafam University Foundation was 26% (65 students) and 54.3% (136 students) are exposed to any of these substances. Conclusion. It was found that the overall prevalence of consumption is high, although it decreases as the students advance in their studies.

Key words: Smoking habit, risk factors, chronic non-communicable diseases

Aprobado: 2025-01-30 15:10:04

Correspondencia: JOSE ALEXANDER VALENCIA SEDANO. Fundación Universitaria CAFAM alexander.valencia@unicafam.edu.co

¹ Facultad de Salud y Bienestar, Bogotá, Bogota D.C., Colombia

INTRODUCCIÓN

En los estilos de vida entre la etapa de adulto joven y adultez se puede observar con frecuencia en la población universitaria, búsqueda de nuevas experiencias lo cual aumenta el riesgo de consumir diferentes sustancias en las cuales se encuentra el cigarrillo convencional (CC) ya hace un tiempo, sin embargo, en los últimos años se ha visto el incremento a nivel mundial de cigarrillo electrónico (CE). Es importante destacar que en ambos productos la nicotina es el componente principal que produce su uso continuo; a pesar la cantidad en el CC es más alto que en el CE. (González, 2019-2020)

El CC es un producto en forma de tubo que se fabrica con hojas de tabaco curadas, firmemente enrolladas en una envoltura en la hoja o con una envoltura que contiene tabaco. De igual manera puede contener diferentes ingredientes, entre ellos la nicotina y otras sustancias para añadir saborizantes. (Gómez Zapata, 2021). Por otra parte, el CE, este es un dispositivo que contiene un líquido con o sin nicotina, una batería que al entrar en funcionamiento calienta el líquido y un atomizador que lo transforma en aerosol, por lo que produce humo; el acto de inhalar este aerosol o vapor es llamado vapeo o vaper. (López Pacheco, 2022)

El consumo de CE disminuyó el de CC, pero la evidencia de resultados contradictorios es un gran problema para la salud pública por la cantidad de muertes que este ocasiona en el año, aproximadamente 8 millones de las cuales 1,2 son la muestra de cómo afecta socialmente al producirse por la exposición del humo ajeno. (OPS, Organización panamericana de la salud, 2022). En 2022, la Encuesta Nacional de Tabaquismo en los Jóvenes reveló que más de 2.5 millones de jóvenes utilizan CE. Demostrando que muchos de estos jóvenes consumen con más frecuencia los que contienen saborizantes, es importante destacar que el consumismo de este producto puede llegar a 20 días o más del mes, demostrando así que el CE tiene un uso mayor o igual que el CC en los jóvenes y adultos jóvenes. (FDA, 2023)

Una encuesta realizada se evidencio que la mayoría de los estudiantes que más consumían cigarrillo u otras sustancias eran los de enfermería los que más hacían uso del cigarrillo ya sea por estrés, adaptación, o porque sus familiares consumen cigarrillo, esto nos deja claro que los estudiantes de enfermería son los

que más consumen cigarrillo y saber cuáles son los lugares donde más realizan este consumo es ahí donde nos podemos basar para buscar las estrategias que ayudaran a evitar el consumo del cigarrillo en estos estudiantes. De igual manera es importante destacar que la mayoría de consumo de CC Y CE se ve evidenciado que estudiantes de la salud en especial en enfermería de este modo se va a describir la prevalencia del consumo de cigarrillo y vapeo de los estudiantes de enfermería de la fundación universitaria Cafam.

MÉTODO

Se diseño una investigación observacional, descriptiva de corte transversal con un enfoque cuantitativo.

La población de estudio fueron los estudiantes de enfermería de la Fundación Universitaria Cafam (Bogotá, Colombia), de los semestres 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De total de estudiantes de esos semestres (250), 201 respondieron la encuestada (80,4 %), entre ellas 145 mujeres y 56 hombres.

La recolección de los datos se realizó en la primera semana de febrero de 2024, al inicio durante los primeros turnos de clase. En el momento de aplicar la encuesta a los estudiantes de cada semestre se les explicó el propósito de la investigación y se invitó a que participara en forma voluntaria y anónima, se utilizó una encuesta virtual realizada por medio de la plataforma forms, la cual tenía la siguiente información:

- Se pregunto Sexo, edad, semestres en el que se encuentra.
- o Indicadores de los que fuman: Al indicar que fuman, se despliegan que sustancia consume CC o CE. La cantidad de veces que consume en el día y mes, tiempo de que no consume, si ha recibido alguna ayuda o apoyo de un profesional, familiar o amigo, la asequibilidad del producto y en que áreas consume estas sustancias.
- Indicadores de los que no fuman: Al indicar que no fuman, se desplego en qué lugar se encuentra expuesto al humo y si ha probado el CC o CE

Los datos fueron recogidos y analizados en el programa Excel. Los datos se presentan mediante número y porcentaje.

A todos los estudiantes se le explico que se los resultados solo se presentarían de manera colectiva, nunca individual y que había confidencialidad de los datos según la ley de habeas data (ley 1581 de 2012).

El estudio fue aprobado por el Consejo de Facultad de la Facultad de Salud de Unicafam.

RESULTADOS

La muestra final fue de 201 estudiantes, lo que representa el 80,4 % del total de los estudiantes de enfermería de la Fundación Universitaria Cafam (tabla 1), de toda la muestra las mujeres fueron 145 (58,1%) y los hombres 56 (22,3%).


Tabla 1. Grupo de edades y genero de los estudiantes de enfermería de la fundación universitaria Cafam. Bogotá, Colombia (2024)

		Recuento	% de N columnas
Género de los estudiantes	Masculino	56	27,9%
	Femenino	145	72,1%
Semestre que cursa	1	39	19,4%
	3	30	14,9%
	4	25	12,4%
	5	28	13,9%
	6	19	9,5%
	7	36	17,9%
	8	24	11,9%
Grupos de edades	20 o menos años	57	28,4%
	21 hasta 30 años	119	59,2%
	Más de 30 años	25	12,4%
	Total	201	100,0%

En la tabla anterior se evidencia que más del 50 % de estudiantes se encuentran en el rango de edad de 21 a 30 años. A su vez, el género que

más resalta es el femenino el cual equivale a más del 70% de los estudiantes encuestados (gráfico 1).


Gráfico 1. Prevalencia del consumo de cigarrillo convencional y cigarrillo electrónico, en estudiantes de la fundación universitaria Cafam. Bogotá, Colombia (2024)



Es importe destacar que de los 201 estudiantes encuestados equivalentes al 80,4% del total de

estudiantes de enfermería, los que respondieron SI consumen cigarrillos o vapeo fueron 65 el 32,3% (gráfico 2).

Gráfico 2. Distribución por semestre del número de consumidores de cigarrillos o vapeo. Fundación universitaria Cafam. Bogotá, Colombia (2024)



Fuente: encuesta realizada

Por otro lado, en el gráfico 3 se muestra que de los 65 estudiantes que tienen hábito 31

consumen solo cigarrillos, 8 vapean y 26 consumen las dos sustancias.

35
30
25
20
15
10
8
5
Cigarrillos
Vapeo
Ambos

Gráfico 3. No de personas que consumo cigarrillos, vapeo o ambas sustancias.

Por último, de 136 personas que no consumen CC ni CE, se destacar que en las instalaciones de la universidad 45 personas están expuestas al humo, es considerable señalar que hay otros hábitos que pueden afectar a los no fumadores y no solo en la universidad. Es importante resaltar que, aunque pocos fuman en la facultad de enfermería, puede haber otras carreras que consuman CC o CE, y afectar la salud de las personas de la universidad.

DISCUSIÓN

Los principales hallazgos de este estudio que aborda la prevalencia del consumo de cigarrillos y vaper en los estudiantes de enfermería de la Fundación Universitaria Cafam revelan que, de una muestra de 201 estudiantes, 65 son fumadores, mientras que 136 no fuman. Además, se observó que 45 estudiantes no fumadores están expuestos al humo en el entorno universitario. Estos hallazgos son significativos, ya que nos permiten comprender la magnitud del consumo de tabaco y vapeo entre los estudiantes de enfermería, así como la exposición al humo de

segunda mano en el campus universitario.

El significado de estos hallazgos radica en la necesidad de implementar medidas específicas para abordar el consumo de tabaco y vapeo entre los estudiantes de enfermería, así como para promover entornos libres de humo que protejan la salud de toda la comunidad universitaria. La exposición al humo de segunda mano también es preocupante, ya que puede tener efectos negativos en la salud de quienes no fuman.

Estos hallazgos se relacionan con investigaciones previas que han demostrado la importancia de abordar el consumo de tabaco y vapeo en entornos académicos, así como la necesidad de promover políticas y programas de prevención del tabaquismo en el ámbito universitario. Asimismo, se relacionan con la evidencia existente sobre los efectos perjudiciales del humo de segunda mano en la salud, lo que refuerza la importancia de crear entornos libres de humo en las instituciones educativas.

Conclusión

El estudio sobre la prevalencia del consumo de cigarrillo y vaper en los estudiantes de enfermería de la Fundación Universitaria Cafam revela datos significativos. Se encontró que la prevalencia general de consumo es alta, aunque disminuye a medida que los estudiantes avanzan en sus estudios. Los factores asociados con el consumo, como la disponibilidad de cigarrillos y la influencia de amistades fumadoras, son relevantes en este contexto. A pesar de reconocer los riesgos asociados al consumo de tabaco, no se puede precisar la extensión y profundidad del conocimiento sobre este tema en la formación de los estudiantes de enfermería. Estos hallazgos subravan la importancia de abordar el consumo de tabaco y vaper entre los estudiantes de enfermería, así como la necesidad de fortalecer la educación y la concienciación sobre los riesgos asociados a estos hábitos.

En conclusión, el estudio sobre la prevalencia del consumo de cigarrillo y vaper en los estudiantes de enfermería de la Fundación Universitaria Cafam revela datos significativos. Se encontró que la prevalencia general de consumo es alta, aunque disminuve a medida que los estudiantes avanzan en sus estudios. Los factores asociados con el consumo, como la disponibilidad de cigarrillos y la influencia de amistades fumadoras, son relevantes en este contexto. A pesar de reconocer los riesgos asociados al consumo de tabaco, no se puede precisar la extensión y profundidad del conocimiento sobre este tema en la formación de los estudiantes de enfermería. Estos hallazgos subrayan la importancia de abordar el consumo de tabaco y vaper entre los estudiantes de enfermería, así como la necesidad de fortalecer la educación y la concienciación sobre los riesgos asociados a estos hábitos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Adriana Blanco Marquizo, S. A. (19 de 05 de 2022). Revista panamericana de slaud pública. Obtenido de Seguir avanzando en las Américas: el control del tabaco fomenta el desarrollo sostenible:

https://www.scielosp.org/article/rpsp/2022.v46/e1 59/es/

Bardach, A. C.-R.-V. (2021). INTERCAMBIO DESDE LOS CIGARRILLOS CONVENCIONALES A LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE ADMINISTRACIÓN DE NICOTINA: REVISIÓN SISTEMÁTICA RÁPIDA CON METAANÁLISIS Y ASPECTOS ECONÓMICOS. Obtenido de Scielo:

https://www.scielosp.org/article/rpmesp/2021.v38 n4/537-550/

Carla Paola Sánchez-Ríos, J. R.-C.-B.-D.-A. (2022). Scielo. Obtenido de Conocimiento sobre los dispositivos electrónicos de entrega de nicotina en médicos residentes de neumología en un centro de referencia: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0028-37462020000300164

Carlos Gómez-Restrepo, C. A.-R. (2019). Scielo. Obtenido de Con respecto al día mundial sin tabaco, ¿los cigarrillos electrónicos pueden afectar la salud y la salud mental?: https://doi.org/10.1016/j.rcp.2019.06.001

Carlos Martin-Cantera, J. L. (2020). Cigarrillos electrónicos. Obtenido de Salut : https://core.ac.uk/download/pdf/347139273.pdf

CRC. (Recuperado en 2024). Congreso de la república de Colombia . Obtenido de https://www.camara.gov.co/desde-el-congreso-bu scan-regular-el-uso-de-vapeadores-y-cigarrillos-el ectronicos-y-prohibir-su

Crofton J, S. D. (2002). a global threat. IATH, Swedish Heart Lung Foundation. En Tobacco (págs. 6-25). a global threat. IATH, Swedish Heart Lung Foundation.

Enfermeras, M. y. (2020). Sustancias químicas nocivas en los productos de tabaco. Obtenido de American cancer society: https://www.cancer.org/es/cancer/prevencion-del-riesgo/tabaco/agentes-cancerigenos-en-los-productos-de-tabaco.html#:~:text=Nicotina%20(sustancia%20qu%C3%ADmica%20adictiva%20que,Plomo

Esperanza Peña, D. O. (08 de 2022). Revista colombiana de ancerología. Obtenido de Carga de enfermedad atribuible al uso de tabaco en Colombia y potenciales beneficios sanitarios y económicos del aumento del precio del cigarrillo mediante impuestos.: https://doi.org/10.35509/01239015.31

Gabriel Hidalgo Guerrero, R. P. (19 de 01 de 2023). Revista latinoamericana de ciencias sociales y humanas. Obtenido de Ansiedad y relación con el consumo de tabaco en estudiantes universitarios: https://latam.redilat.org/index.php/lt/article/view/248/229

Gómez Zapata, Y. Z. (22 de 12 de 2021). Sello Editorial Tecnológico de Antioquia. Obtenido de Introducción del cigarrillo y del tabaco elaborados en el departamento de Antioquia: desafíos y recomendaciones.: https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/1907

González, B. V. (2019-2020). UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. Obtenido de https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/41670/TFG-M-M1863.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Gordillo Seminario, S. d. (2021). Cybertesis. Obtenido de Estilo de vida de los estudiantes universitarios en Latinoamérica, período 2013-2019:

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500. 12672/16808

Guasco-Pérez, L. (2022). Vida Científica Boletín Científico de la Escuela Preparatoria. Obtenido de Técnicas y Metodología de Intervención Cognitiva-Conductual: Técnicas: https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/prepa4/article/download/9535/9244/

J., H. (1998). Cigarette smoke components and disease: cigarette smoke is more than a triad of tar, nicotine and carbon monoxide. En H. J.. Estados Unidos: US Department of Health and Human Services, Public Health Service, and National Cancer Institute..

Jha P, C. F. (1999). Governments and the Economics of Tobacco Control. En C. F. Jha P, Curbing the epidemic (págs. 15-21). Washignton: The International Bank for Reconstruction and Development.

Kyara Herrera-Pamplona, Z. C.-M.-E. (05 de 2019). Scielo. Obtenido de Cancer mortality associated with cigarette consumption in the colombian caribbean 2009-2013: https://doi.org/10.17533/udea.rfnsp.v37n2a13

La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, I. S. (2009). EVA. Obtenido de Gestor normativo ley 1335/2009: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36878#:~:text=El%20objet o%20de%20la%20presente,derivados%2C%20as%C3%AD%20como%20la%20creaci%C3%B3n

local, a. (2020). DANE. Obtenido de http://www.barriosunidos.gov.co/sites/barriosunidos.gov.co/files/archivos-adjuntos/anexo_01._docu mento tecnico local pdl bbuu 17-08-20 1 1.pdf

López Pacheco, K. M. (2022). Revista Conrado. Obtenido de Evaluación de las alteraciones en la cavidad oral en fumadores de cigarrillo electrónico:

https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2682

Lucy E. Correa-López, A. M.-R.-R.-M.-R.-M. (07 de 2020). Scielo. Obtenido de Factores asociados al consumo de tabaco en estudiantes universitarios de lima metropolitana: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_ar ttext&pid=S2308-05312020000200227

Maria Cooper, A. L. (02 de 2018). National Library of medicine. Obtenido de College students' perceptions of risk and addictiveness of e-cigarettes and cigarettes: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5278646/

Martínez-Sánchez, J. M.-S. (12 de 01 de 2023). Universitatinternacional de cataluya. Obtenido de Cigarrillo electrónico: ¿amenaza o aliado para el control del tabaquismo?: http://hdl.handle.net/10803/687455

Ministerio de salud. (19 de 05 de 2022). Obtenido d e

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-tiene-un-millon-de-fumadores-menos.aspx#:~:text =Gracias%20a%20las%20medidas%20adoptadas,un%20mill%C3%B3n%20menos%20de%20fumadores.&text=%E2%80%8BBogot%C3%A1%20D. C.%2C%2019%20de%20mayo%20de%202022.

MS. (Recuperado de 2024). Ministerio de salud. Obtenido de CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS EN CIFRAS.:

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Generaci% C3%B3n%20m%C3%A1s%20%20somos%20m% C3%A1s%20sin%20tabaco.aspx

OMS. (27 de 02 de 2024). Organización Mundial De La Salud. Obtenido de OMS: https://who.int/es/news/item/14-12-2023-urgente-action-needed-to-protect-children-and-prevent-the-uptake-of-cigarrillos electrónicos

OMS. (Recuperado en 2024). Organización de la salud. Obtenido de https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/tobacco-e-cigarettes

OPS. (2021). Organización panamericana de la salud. Obtenido de Enfermedades no Transmisibles y Salud Mental:

https://www.paho.org/es/enfermedades-no-trans misibles-salud-mental

OPS. (2022). Organización panamericana de la salud. Obtenido de Control del tabaco: https://www.paho.org/es/temas/control-tabaco

OPS. (Recuperado en 2024). Organización panamericana de la salud. Obtenido de Ocho países de las Américas prohíben los cigarrillos electrónicos:

https://www.paho.org/es/noticias/25-8-2023-ocho-paises-americas-prohiben-cigarrillos-electronicos

Ortega-Ceballos PA, T.-M. M.-J.-D. (2018). Enfermería universitaria Scielo. Obtenido de Conocimientos, actitudes y factores asociados al consumo de tabaco en estudiantes universitarios de enfermería: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-70632018000200159

Oscar Núñez, R. R.-V.-B. (2019). Scielo. Obtenido de Etapas de cambio comportamental frente al consumo de sustancias psicoactivas en escolares de 9 a 17 años de Bogotá D.C., Colombia: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-00112019000100029&script=sci arttext

Robayo-González, C. B.-G. (2019). Revista de salud pública (Bogotá, Colombia). Obtenido de Efectos sobre la salud de los cigarrillos electrónicos. Una revisión de la literatura:

https://doi.org/10.15446/rsap.v21n1.77032

Roberto A. Accinelli, J. L. (19 de 03 de 2020). Revista peruana de medicina experimental y salud pública. Obtenido de El cigarrillo electrónico: un problema de salud pública emergente:

https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/4780

Salud, M. d. (Recuperado en 2024). Ministerio de salud. Obtenido de https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Cada-annomas-de-34-800-muertes-en-Colombia-estan-relacionadas-con-el-consumo-de-productos-de-tabaco.aspx

Santiago Páez C., D. I. (12 de 2021). Scielo. Obtenido de Percepción y prevalencia del consumo de cigarrillos electrónicos en estudiantes de Medicina.: https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-7348 2021000400275&script=sci_arttext SGR, C. (2020). Centers for disease control and prevention. Obtenido de Smoking Cessation—The Role of Healthcare Professionals and Health Systems:

https://www.cdc.gov/tobacco/sgr/2020-smoking-cessation/fact-sheets/healthcare-professionals-health-systems/index.html?CDC_AA_refVal=https%3 A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Ftobacco%2Fdata_statistics%2Fsgr%2F2020-smoking-cessation%2Ffact-sheets%2Fhealthcare-professiona